

## HIV 药物和女性 - HIV 药物，第 7 部分

HIV 治疗名为抗逆转录病毒治疗或 ART，是对各种 HIV 药物加以组合，称之为 HIV 治疗方案。建议每一位 HIV 感染者都服用 ART。



医疗保健提供者对男性和女性提供的关于 HIV 药物的建议大部分是相同的。但女性有些特殊问题可能会影响其 HIV 治疗。

### 副作用

HIV 药物的某些副作用可能会在女性身上更频繁或更严重地发作。




### 避孕

部分 HIV 药物可能会令避孕药、避孕贴、避孕环或植入避孕线等激素类避孕用品的效用降低。服用这些 HIV 药物的女性可能需要使用额外或其他的避孕方式。

### 怀孕

感染有 HIV 的女性在孕期和分娩时服用 HIV 药物，以降低 HIV 的母婴传播风险。这样也可保护女性的健康。孕期变化可能会影响身体利用 HIV 药物的方式，因此 HIV 药物的剂量可能会在孕期内发生变化。HIV 药物的某些副作用会使感染者更难在孕期内坚持 HIV 治疗方案。



没有任何 HIV 药物与先天缺陷有明确关联，但某些药物已经引起关注。孕妇及其医疗保健提供者可以共同为 HIV 治疗方案选择能够在孕期内安全有效地发挥作用的药物。

确保获得您对 HIV/AIDS 所存有的任何问题的答案。您的公共健康部门、医疗保健提供者和公共图书馆可以为您提供帮助。

Text is from HIV/AIDS sources from the Department of Health and Human Services and adapted by HealthReach and Healthy Roads Media. This project has been funded in whole or in part with Federal funds by the National Library of Medicine award number HHSN276201500011I awarded to the Center for Public Service Communications. Images from iStock.com.