

HIV 药物和老年人 - HIV 药物，第 8 部分



在美国，大约有 1/4 的 HIV 感染者年龄超过 55 岁。名为抗逆转录病毒治疗 (ART) 的 HIV 药物治疗对于所有 HIV 感染者来说都非常重要。借助 HIV 药物的终生治疗可帮助年长的 HIV 感染者更健康长寿地生活。

针对老年人和年轻人的 HIV 治疗建议是相同的。然而，与年龄有关的问题可能会影响老年人的 HIV 治疗。

当人变老时，肝脏和肾脏无法很好地工作。这会使人体更难利用 HIV 药物并增加副作用的风险。感染有 HIV 的老年人可能还有糖尿病或心脏病等其他状况。

此外，HIV 可能影响人体衰老的方式。HIV 会增加人体出现与年龄相关的状况之风险，例如痴呆和某些癌症。

同时服用 HIV 药物和针对其他状况的药物可能会增加药物相互作用的风险。这种情况被称为药物-药物相互作用。它还会增加药物副作用。



开始服用 ART 后，老年人的免疫系统恢复可能没有年轻人那么好或那么快。



尽管存在这些问题，老年人的药物依从性要比年轻人更好。药物依从性指的是每天准确地按规定服用 HIV 药物。

确保获得您对 HIV/AIDS 所存有的任何问题的答案。您的公共健康部门、医疗保健提供者和公共图书馆可以为您提供帮助。

Text is from HIV/AIDS sources from the Department of Health and Human Services and adapted by HealthReach and Healthy Roads Media. This project has been funded in whole or in part with Federal funds by the National Library of Medicine award number HHSN2762015000111 awarded to the Center for Public Service Communications. Images from iStock.com.