

谁应进行 HIV 检测？ - HIV 检测，第 2 部分

建议 13 到 64 岁的每个人至少进行一次 HIV 检测。也建议 HIV 感染风险增加的人群进行检测。



这些风险包括：

- 与 HIV 检测呈阳性或 HIV 状态未知的人不使用安全套发生性行为
- 注射药物或与他人共用针头、注射器和其他药品器具
- 以性行为换取金钱或药物
- 患性传播疾病 (STD)。性传播疾病有二十多种类型，包括梅毒、淋病和衣原体疾病。
- 患肝炎或肺结核 (TB)
- 与存在任何此处列举的 HIV 风险因素的任何人发生性行为



每个孕妇在妊娠期都应尽早进行 HIV 检测。即使之前已接受过检测，也应再检测一次。

遭受性侵犯的人群应在侵犯发生后尽快进行 HIV 检测。

与新伴侣初次发生性行为前，二人应坦诚布公地谈谈各自的性经历和用药史。

还应谈谈各自的 HIV 感染状态，并应考虑在发生性行为前进行 HIV 检测。一些检测呈阴性的患者会假定其伴侣的 HIV 检测也一定呈阴性。但您的 HIV 检测只代表您的感染状态，而不是您伴侣的。

与医疗保健提供者谈谈您自身的 HIV 感染风险和 HIV 检测。

若您对 HIV/AIDS 有任何疑问，请务必咨询。您的公共健康部门、医疗保健提供者和公共图书馆会提供帮助。



Text is from HIV/AIDS sources from the Department of Health and Human Services and adapted by HealthReach and Healthy Roads Media. This project has been funded in whole or in part with Federal funds by the National Library of Medicine award number HHSN2762015000111 awarded to the Center for Public Service Communications. Images from iStock.com.