

HIV 检测结果呈阴性代表什么？ - HIV 检测，第 6 部分

阴性结果并非始终准确。这要取决于您可能已接触到 HIV 及进行检测的时间。




结果不准的原因是病毒存在窗口期，即您可能已接触到 HIV 之后、检测可将其检出前的时间段。窗口期取决于您采用的 HIV 检测类型。

如果您在可能接触 HIV 后 3 个月内进行抗体检测，且结果呈阴性，请在 3 个月后再检测。

核酸检测或 NAT 的上述时间期限要更短一些。NAT 检测也被称作组合检测，RNA 检测或病毒载量检测。

HIV 检测检出阴性结果后，向您的医疗保健提供者咨询是否需接受再次检测，以及何时进行。



要

同时，请继续采取如下等措施避免感染 HIV：

- 性行为过程中使用安全套
- 避免与他人共用针头或其他药品器具或“用具”
- 如果您的 HIV 检测呈阴性但属 HIV 高危感染人群，请服用暴露前预防 (PrEP) 药物，帮助预防 HIV 感染。



切记 - 阴性结果只能代表过去的病毒接触安全。如果您的检测结果呈阴性，但继续参与高风险行为，那么您仍面临 HIV 感染风险。

确保获得您对 HIV/AIDS 所存有的任何问题的答案。您的公共健康部门、医疗保健提供者和公共图书馆可以为您提供帮助。

Text is from HIV/AIDS sources from the Department of Health and Human Services and adapted by HealthReach and Healthy Roads Media. This project has been funded in whole or in part with Federal funds by the National Library of Medicine award number HHSN2762015000111 awarded to the Center for Public Service Communications. Images from iStock.com.