


## 女性和 HIV — 刚被确诊为 HIV 感染，第 4 部分

男性和女性需要的 HIV 护理类型相似，但也存在一些重要差异：

- 女性经常因感染 HIV 而患上妇科疾病。这些疾病包括难治性阴道酵母菌感染、盆腔炎并会增加患宫颈癌的可能性。
- 女性可能会对目前或未来的妊娠和分娩感到担忧。最好与您的提供者谈谈这些担忧。
- 被诊断出感染 HIV 的女性应尽快接受子宫颈抹片检查和盆腔检查。这些女性应该在 6 个月后接受后续宫颈抹片检查。



- 女性的卡波西肉瘤发病率很低，这是在 HIV 发展为 AIDS 时出现的一种癌症。
  - 女性通常在 HIV 感染阶段后期才被确诊，因此更容易受机会性感染的影响。
- 它们被称作机会性感染 (OI)，因为其伺机在您免疫系统薄弱时引发感染。
  - 通常情况下，女性在接受 HIV 护理时必须为自己和治疗提供强大支持。
  - 女性经常面临多重护理障碍，例如单身母亲、收入有限以及对 HIV 抱有社会耻辱感或羞耻感。
  - 不再担心受孕的女性不大可能会使用避孕套或进行安全性行为。这会增加其 HIV 感染风险。

确保获得您对 HIV/AIDS 所存有的任何问题的答案。您的公共健康部门、医疗保健提供者和公共图书馆可以为您提供帮助。



Text is from HIV/AIDS sources from the Department of Health and Human Services and adapted by HealthReach and Healthy Roads Media. This project has been funded in whole or in part with Federal funds by the National Library of Medicine award number HHSN2762015000111 awarded to the Center for Public Service Communications. Images from iStock.com.