

开始服用 PrEP 前应了解哪些事项? - PrEP, 第 3 部分



PrEP（暴露前预防）是易通过性行为或注射药物感染 HIV 的高危非感染者用药。

只有医疗保健提供者才可以开具 PrEP，所以与您的医疗保健提供者谈谈从而了解 PrEP 是否适合您。PrEP 必须每天服用才能见效。

在开始使用 PrEP 前，您必须进行 HIV 检测，以确定您尚未感染 HIV。在您服用 PrEP 期间，您必须每 2 至 3 个月拜访一次您的医疗保健提供者，以接受跟踪治疗。

许多健康保险计划都承保 PrEP 的费用，商业药物援助计划还为收入有限的人群和没有保险支付 PrEP 护理费的人士提供免费 PrEP。



已接触 HIV 之后，还能开始服用 PrEP 吗？

不能。PrEP（暴露前预防）的服用人群只能是目前 HIV 检测呈阴性的 HIV 感染高危人群。

PrEP 不会为您提供其他性传播疾病 (STD) 防护。如果您因注射药物使用的风险而服用 PrEP，那么 PrEP 不会帮助您对抗丙型肝炎或其他与毒品相关的感染。



虽然每天服用 PrEP 能极大降低 HIV 的感染风险，但您可以通过经常使用安全套等低风险行为进一步降低您的感染风险。

确保获得您对 HIV/AIDS 所存有的任何问题的答案。您的公共健康部门、医疗保健提供者和公共图书馆可以为您提供帮助。

Text is from HIV/AIDS sources from the Department of Health and Human Services and adapted by HealthReach and Healthy Roads Media. This project has been funded in whole or in part with Federal funds by the National Library of Medicine award number HHSN2762015000111 awarded to the Center for Public Service Communications. Images from iStock.com.