

PrEP 需服用多久？ - PrEP，第 6 部分

PrEP，或暴露前预防，是易通过性行为或注射药物感染 HIV 的高危非感染者用药。

PrEP 必须每天服用才能见效。但也有几个停止服用 PrEP 的原因。




例如，如果您因生活改变导致 HIV 感染风险变得较低，您可能希望停止服用 PrEP。请记住，PrEP 只是 HIV 高风险人群用药。

若要使 PrEP 起效，您必须：

- 每日服用 PrEP
- 每 2 至 3 个月接受一次医疗保健提供者的检查

如果您发现自己不想每日服药或经常忘记服药，那么其他对抗 HIV 感染的方法可能更适合您。




如果服用药物出现副作用进而影响了您的生活，或如果血液检查结果表明您的身体对 PrEP 出现反应，那么您可能需要停止服用 PrEP。

每日服用 PrEP 很安全并对预防 HIV 感染有显著成效。

在多数服用 PrEP 数年的 HIV 阴性人群中，尚未发现任何明显的健康影响。

确保获得您对 HIV/AIDS 所存有的任何问题的答案。您的公共卫生部门、医疗保健提供者和公共图书馆可以为您提供帮助。



Text is from HIV/AIDS sources from the Department of Health and Human Services and adapted by HealthReach and Healthy Roads Media. This project has been funded in whole or in part with Federal funds by the National Library of Medicine award number HHSN276201500011I awarded to the Center for Public Service Communications. Images from iStock.com.