

HIV 如何实现母婴传播 - 怀孕, 第 1 部分



母亲感染 HIV 并不意味着孩子也将感染 HIV。在现代 HIV 治疗技术应用前, 美国大约有 1/4 的 HIV 呈阳性的孕妇将病毒传播给体内婴儿。

今天, 如果孕妇服用 HIV 药物且血液内未发现病毒, 那么她将 HIV 传给婴儿的风险不足 1%。但孕期和分娩时的母婴传播仍然是儿童感染 HIV 的最常见方式。这种传播方式被称为母婴传播或围产期传播。

HIV 呈阳性的母亲可以通过三种方式将 HIV 传播给婴儿:

- **孕期内**


如果母亲感染 HIV, 就可能将 HIV 病毒传播给子宫内的胎儿。

- **经阴道分娩过程中**

当婴儿通过产道时, 接触到母亲血液或其他体液内的 HIV。

- **通过母乳喂养**

母亲可能会通过母乳将病毒传播给婴儿, 即使她正确地服用 HIV 药物。



还有报告称, 有些儿童因食用被 HIV 感染者咀嚼过的食物而被感染 HIV。不应向婴儿喂食咀嚼过的食物。



确保获得您对 HIV/AIDS 所存有的任何问题的答案。您的公共健康部门、医疗保健提供者和公共图书馆可以为您提供帮助。

Text is from HIV/AIDS sources from the Department of Health and Human Services and adapted by HealthReach and Healthy Roads Media. This project has been funded in whole or in part with Federal funds by the National Library of Medicine award number HHSN276201500011I awarded to the Center for Public Service Communications. Images from iStock.com.