

HIV 检测和怀孕 - 怀孕，第 3 部分



借助更多的 HIV 检测和新药物，孕期、分娩和母乳喂养过程中感染 HIV 的婴儿数目在过去 20 年间已减少了 90%。

父母双方在打算怀孕前应接受 HIV 测试，即使之前已进行过测试。

此外，所有女性在孕早期的第一次产前护理检查时都应接受 HIV 测试。

并非所有的医疗保健诊所都为孕妇进行常规 HIV 测试。如果不提供 HIV 测试，请确保请求测试。

部分女性如有特定风险，应在孕期接受第二次 HIV 测试。这可能包括出现过可能使其面临感染 HIV 之风险的行为。



如果孕妇进入临产却未接受过 HIV 测试，则应在临产分娩室进行快速 HIV 测试。这样的话，如果测试结果为阳性，医生可以帮助避免 HIV 通过母亲传给婴儿。如果母亲的 HIV 测试结果为阳性，那么孩子也应立即在出生后接受 HIV 测试。

HIV 测试呈阳性的母亲选择在照顾接触过 HIV 的婴儿方面有经验的医生或诊所是非常有益的。他们会准确地知道婴儿需要哪些后续测试以及这些测试应何时进行。

确保获得您对 HIV/AIDS 所存有的任何问题的答案。您的公共健康部门、医疗保健提供者和公共图书馆可以为您提供帮助。



Text is from HIV/AIDS sources from the Department of Health and Human Services and adapted by HealthReach and Healthy Roads Media. This project has been funded in whole or in part with Federal funds by the National Library of Medicine award number HHSN2762015000111 awarded to the Center for Public Service Communications. Images from iStock.com.