

## HIV 和新生儿 - 怀孕，第 5 部分

母亲可能在孕期过程中、临产时、生产时或通过母乳喂养将 HIV 传播给婴儿。值得欣慰的是有许多方法可以将 HIV 传播给未出生婴儿的风险下降到几乎为零。



出生后的 6 到 12 小时内，由 HIV 感染者分娩出的婴儿需服用名为齐多呋定或叠氮胸苷的 HIV 药物。

HIV 药物可保护婴儿免遭任何可能在分娩时通过母婴方式传播的 HIV 感染。

由 HIV 感染者分娩出的婴儿通常应在出生后的 14 到 21 天、1 到 2 个月，以及 4 到 6 个月分别进行 HIV 测试。



所采用的 HIV 测试名为病毒学测试，会直接检查血液内的病毒。至少需要两次 HIV 病毒学测试的结果才能确定婴儿是否感染有 HIV。

如果测试显示婴儿已感染 HIV，那么所服用的药物将从齐多呋定转换为抗逆转录病毒治疗 (ART)，以作为终生 HIV 护理的一部分。

确保获得您对 HIV/AIDS 所存有的任何问题的答案。您的公共健康部门、医疗保健提供者和公共图书馆可以为您提供帮助。



Text is from HIV/AIDS sources from the Department of Health and Human Services and adapted by HealthReach and Healthy Roads Media. This project has been funded in whole or in part with Federal funds by the National Library of Medicine award number HHSN2762015000111 awarded to the Center for Public Service Communications. Images from iStock.com.