

性风险和 HIV 检测 - 性风险，第 4 部分

如果您上一次的 HIV 测试结果为阴性，但却符合下列任何一种情况，则应接受 HIV 测试：

- 您是曾与另一名男性发生过性行为的男性吗？
- 您是否曾与 HIV 测试呈阳性的伴侣发生过性行为？
- 自您上一次 HIV 测试以来，您是否拥有多个性伴侣？



- 您是否患有其他性传播疾病 (STD)？
- 您是否曾与不了解其性史的某人发生过性行为？
- 您是否曾为药物或金钱而进行性行为交易？

某些感染 HIV 的人士认为没有理由去和其他 HIV 测试呈阳性的伴侣进行更安全的性行为。但危险性行为可能会让您面临感染其他性传播疾病的风险，从而可能损害您的免疫系统。

因此如果您与其他人发生性行为，性伴侣双方都定期接受性传播疾病检查非常重要。

确保获得您对 HIV/AIDS 所存有的任何问题的答案。您的公共健康部门、医疗保健提供者和公共图书馆可以为您提供帮助。



Text is from HIV/AIDS sources from the Department of Health and Human Services and adapted by HealthReach and Healthy Roads Media. This project has been funded in whole or in part with Federal funds by the National Library of Medicine award number HHSN2762015000111 awarded to the Center for Public Service Communications. Images from iStock.com.