

药物使用是如何与 HIV 相关联的？ - 物质滥用，第 1 部分



药物使用在 HIV 传播方面发挥着重要作用。举例来说，美国的注射药物使用每年可导致大约 10% 的 HIV 感染病例的出现。

如果您注射药物，就会可能因与 HIV 感染者共用药物制备和注射器具或“用具”而感染 HIV。

这就是 HIV 在您、与您共用药物的人，以及您的性伴侣之间传播的方式。服用药物可能不仅会增加您感染 HIV 的风险，还会增大您感染其他性传播疾病 (STD) 的风险。

神志不清醒会影响您做出安全选择的能力并增加您承担风险的几率。这可能包括不戴避孕套的性行为或与多个性伴侣发生性行为。

以性交易换取药物或金钱也可能增加您感染 HIV 的风险。如果您使用药物，则感染 HIV 的风险就更大并应接受测试。



如果您已感染 HIV，那么服用药物可能会影响您的免疫系统并可能令您的 HIV 感染状况变得更糟。



服用药物还可能影响您的 **HIV 治疗依从性**，它指的是每天正确服用您的药物。当您在神志不清醒时，可能会忘记按时服用药物或彻底忘记服用药物。

确保获得您对 **HIV/AIDS** 所存有的任何问题的答案。您的公共健康部门、医疗保健提供者和公共图书馆可以为您提供帮助。

Text is from HIV/AIDS sources from the Department of Health and Human Services and adapted by HealthReach and Healthy Roads Media. This project has been funded in whole or in part with Federal funds by the National Library of Medicine award number HHSN2762015000111 awarded to the Center for Public Service Communications. Images from iStock.com.