

## 酒精是如何与 HIV 相关联的？ - 物质滥用，第 2 部分

酒精使用和滥用可能会增加 HIV/AIDS 的传播。它还可能会影响感染 HIV 的患者的治疗。饮酒，尤其是**酗酒**，可能会增加您感染 HIV 的风险。



喝醉会影响您做出安全选择的能力并增加您承担风险的几率。这可能会导致您做出在清醒状态下不太可能做出的事情，例如不戴避孕套发生性行为。

这种危险行为可能增加您被感染 HIV 和其他性传播疾病 (STD) 的几率。



重度饮酒可能导致您判断力变差。这可能导致您延迟接受 HIV 测试。然后，如果您的 HIV 测试呈阳性，那么酒精滥用可能导致您延迟启动治疗，因为您无法清晰地思考。

酒精滥用还可能令您很难遵守治疗 HIV/AIDS 所需的复杂服药时间表。

酒精滥用可能导致肝脏疾病和其他可能令 HIV 疾病恶化的医疗状况。

确保获得您对 HIV/AIDS 所存有的任何问题的答案。您的公共健康部门、医疗保健提供者和公共图书馆可以为您提供帮助。



Text is from HIV/AIDS sources from the Department of Health and Human Services and adapted by HealthReach and Healthy Roads Media. This project has been funded in whole or in part with Federal funds by the National Library of Medicine award number HHSN276201500011I awarded to the Center for Public Service Communications. Images from iStock.com.