

## 常见的滥用药物和 HIV 风险 — 物质滥用，第 5 部分

滥用**类鸦片药物**的流行已经将新的人群置于不断增加的 HIV 感染风险之中。这种流行包括处方类鸦片药物滥用和海洛因使用。



农村地区和小城市居民过去感染 HIV 的风险很低。随着这些地区受类鸦片药物流行的影响，越来越多的人被感染 HIV。这些地区通常很少有能够帮助本地人群的 HIV 和药物滥用治疗服务。



**可卡因**会让您面临 HIV 感染的风险，因为它可以导致您做出不明智的决策。这可能会导致危险性行为。购买可卡因会快速地花光您的积蓄。然后您可能会转向性交易来获取药物或金钱。这会增加您的 HIV 感染风险。与非使用者相比，可卡因使用者报告有更多的近期和终生性伴侣。此外，可卡因使用者会更少地在 HIV 预防计划中获得成功。

**甲基苯丙胺**或“脱氧麻黄碱”可以干扰您的判断。这会增加您通过性行为和注射药物使用感染 HIV 的风险。对于拥有男士性伴侣的男性来说，脱氧麻黄碱的使用和 HIV 感染之间存在着紧密的关联。脱氧麻黄碱还可能令 HIV 感染者的 HIV 疾病状况恶化。

如摇头丸、克他命和 **GHB** 等“**俱乐部药物**”可以改变您的判断。服用俱乐部药物后，您更有可能发生计划外的无保护性行为或使用其他药物。这些行为会增加您的 HIV 感染风险。

使用硝酸戊酯吸入剂，又称“**春药**”，也可能导致 HIV 感染风险增加。春药与危险性行为、非法药物使用，以及同性恋和双性恋男性间的性传播疾病的感染相关联。春药还越来越多地被青少年所使用。

确保获得您对 HIV/AIDS 所存有的任何问题的答案。您的公共健康部门、医疗保健提供者和公共图书馆可以为您提供帮助。



Text is from HIV/AIDS sources from the Department of Health and Human Services and adapted by HealthReach and Healthy Roads Media. This project has been funded in whole or in part with Federal funds by the National Library of Medicine award number HHSN2762015000111 awarded to the Center for Public Service Communications. Images from iStock.com.