

物质滥用和 HIV 检测 — 物质滥用，第 6 部分

如果您上一次的 HIV 测试结果为阴性并且符合下列任何一种情况，则应接受 HIV 测试。



- 您是否曾注射过药物，然后与他人共享针头和药物制备器具或“用具”？
- 您是否曾为药物或金钱而进行性行为交易？
- 您是否曾与不了解其药物使用史的某人发生过性行为？

如果您继续出现任何一种行为，则应至少每年进行一次测试。

担心被捕、负罪感和自尊心低可能会阻碍药物滥用者接受 HIV 测试或治疗。这会将他们置于更高的 HIV 感染风险中。如果他们感染有 HIV，那么药物滥用还会增加其将 HIV 传播给他人的风险。

与您的医疗保健提供者讨论接受 HIV 测试。您也可以在 HIV 测试地点接受测试。

了解哪些类型的 HIV 测试可用。有些测试可以在您被感染后快速地检测到 HIV。其他测试会花费较长时间才能得出准确结果。您在家中就可以进行一些具有医疗准确性的 HIV 测试。



确保获得您对 HIV/AIDS 所存有的任何问题的答案。您的公共健康部门、医疗保健提供者和公共图书馆可以为您提供帮助。

Text is from HIV/AIDS sources from the Department of Health and Human Services and adapted by HealthReach and Healthy Roads Media. This project has been funded in whole or in part with Federal funds by the National Library of Medicine award number HHSN2762015000111 awarded to the Center for Public Service Communications. Images from iStock.com.