

HIV 和药物滥用 - PEP 和 PrEP 的作用 - 药物滥用，第 7 部分



“PrEP”代表**暴露前**预防。PrEP 是一种帮助未感染 HIV 但却有极高感染风险的人士避免 HIV 感染的药物。

PrEP 仅可由医疗保健提供者开具，因此请与您的提供者讨论，以了解这是不是适合您的 HIV 感染预防策略。

如果您曾在过去 6 个月内注射过药物并出现过下列情况，则推荐您使用 PrEP:


- 在过去 6 个月内共享过针头或注射器具，或
- 在过去 6 个月内参加过药物治疗计划。

“PEP”代表**暴露后**预防。PEP 是一种在可能的近期病毒接触后避免 HIV 感染的药物。如果您认为自己可能已通过共享的针头或药物制备器具来使用药物，从而接触到 HIV，请立即与您的医疗保健提供者或急诊室医生讨论 PEP。



PEP 应仅在紧急状况下使用。它必须在可能的 HIV 接触后 72 小时内开始服用。

PEP 和 PrEP 的作用效果都很好，但也并非 100% 有效。您在服药期间应停止使用药物。如果您无法停止，请确保不会共享针头或药物器具。请与您的药物共享伙伴讨论如何降低 HIV 感染风险及 PEP 和 PrEP。



确保获得您对 HIV/AIDS 所存有的任何问题的答案。您的公共健康部门、医疗保健提供者和公共图书馆可以为您提供帮助。

Text is from HIV/AIDS sources from the Department of Health and Human Services and adapted by HealthReach and Healthy Roads Media. This project has been funded in whole or in part with Federal funds by the National Library of Medicine award number HHSN276201500011I awarded to the Center for Public Service Communications. Images from iStock.com.