

副作用 — HIV 藥物，第 3 部分



名為抗逆轉瀉病毒療法 (ART) 的 HIV 治療是各種 HIV 藥物的組合，名為 HIV 治療方案。HIV 藥物有助於 HIV 感染者更健康長壽地生活，但此藥物也可能引發副作用。大部分副作用都是溫和的，但也有少部分副作用可能比較嚴重。

不同的 HIV 藥物可能導致不同的副作用。服用相同 HIV 藥物的人群可能出現截然不同的副作用。

許多更新的 HIV 藥物可能要比舊的 HIV 藥物產生的副作用要少。您的醫療保健提供者將與您共同決定包含在您的 HIV 治療方案中的最佳藥物。

如果您正在服用 HIV 藥物，請將任何副作用告知您的醫療保健提供者。部分副作用，如頭痛或偶爾眩暈，可能並不嚴重。但頭部、眼睛、嘴唇、喉嚨或舌頭的任何腫脹都是非常嚴重的副作用，需要立即採取醫療護理。

有時這些副作用可能與您的 HIV 藥物毫無關聯。副作用可能由並非 HIV 的另一種醫療狀況引起，例如可治療的感染。您的醫療保健提供者可以告知您的副作用是否由 HIV 藥物引起，或者是否由另一種醫療狀況引起。



副作用可能僅持續幾天或數週，或是持續更長時間。但它們不會在開始使用 HIV 藥物後持續數月甚至數年。您的醫療保健提供者可以更改您的 HIV 藥物，以減少副作用。HIV 治療方案內可包含的 HIV 藥物有很多種。



除非經您的醫療保健提供者告知，否則**請勿**減少、跳過或停止服用您的 HIV 藥物。

若您對 HIV/AIDS 有任何疑問，請務必諮詢。您的公共健康部門、醫療保健提供者和公共圖書館能提供幫助。

Text is from HIV/AIDS sources from the Department of Health and Human Services and adapted by HealthReach and Healthy Roads Media. This project has been funded in whole or in part with Federal funds by the National Library of Medicine award number HHSN2762015000111 awarded to the Center for Public Service Communications. Images from iStock.com.