

HIV 藥物和女性 — HIV 藥物，第 7 部分

名為抗逆轉濾病毒療法 (ART) 的 HIV 治療是各種 HIV 藥物的組合，名為 HIV 治療方案。我們建議所有 HIV 感染者都服用 ART。

醫療保健提供者為男性和女性提供的關於 HIV 藥物的建議大部分是相同的。但女性有些特殊問題可能會影響其 HIV 治療。



副作用

HIV 藥物的某些副作用可能會在女性身上更頻繁或更嚴重地發作。



避孕


部分 HIV 藥物可能會令避孕藥、避孕貼、避孕環或植入避孕線等激素類避孕用品的效用降低。服用這些 HIV 藥物的女性可能需要使用額外或其他的避孕方式。

懷孕

感染有 HIV 的女性在孕期和分娩時服用 HIV 藥物，以降低 HIV 的母嬰傳播風險。這樣也可保護女性的健康。孕期變化可能會影響身體利用 HIV 藥物的方式，因此 HIV 藥物的劑量可能會在孕期內發生變化。HIV 藥物的某些副作用會使感染者更難在孕期內堅持 HIV 治療方案。

沒有任何 HIV 藥物與先天缺陷有明確關聯，但某些藥物已經引起關注。孕婦及其醫療保健提供者可以共同為 HIV 治療方案選擇能夠在孕期內安全有效地發揮作用的藥物。

若您對 HIV/AIDS 有任何疑問，請務必諮詢。您的公共健康部門、醫療保健提供者和公共圖書館能提供幫助。



Text is from HIV/AIDS sources from the Department of Health and Human Services and adapted by HealthReach and Healthy Roads Media. This project has been funded in whole or in part with Federal funds by the National Library of Medicine award number HHSN276201500011I awarded to the Center for Public Service Communications. Images from iStock.com.