

誰應進行 HIV 檢測？－ HIV 測試，第 2 部分

建議 13 到 64 歲的每個人至少進行一次 HIV 檢測。

也建議 HIV 感染風險增加的人群進行檢測。這些風險包括：



- 與 HIV 檢測呈陽性或 HIV 狀態未知的人無套性交
- 注射毒品或與他人共用針頭、注射器和其他藥品器械
- 用性換取金錢或毒品
- 患 STD，或性傳播疾病。STD 有二十多種類型，包括梅毒、淋病和衣原體疾病。
- 患肝炎或肺結核 (TB)
- 與存在任何此處列舉的 HIV 風險因素的任何人發生性行為



每個孕婦在妊娠期都應盡早進行 HIV 檢測。即使之前已接受過檢測，也應再檢測一次。

遭受性侵犯的人群應在侵犯發生後盡快進行 HIV 檢測。

與新伴侶初次性交前，二人應坦誠布公地談談各自的性經歷和用藥史。還應談談各自的 HIV 感染狀態，並應考慮在性交前進行 HIV 檢測。一些檢測呈陰性的患者會假定其伴侶的 HIV 檢測也一定呈陰性。但您的 HIV 檢測只代表您的感染狀態，而不是您伴侶的。

與醫療保健提供者談談您自身的 HIV 感染風險和 HIV 檢測。

若您對 HIV/AIDS 有任何疑問，請務必諮詢。您的公共健康部門、醫療保健提供者和公共圖書館會提供幫助。



Text is from HIV/AIDS sources from the Department of Health and Human Services and adapted by HealthReach and Healthy Roads Media. This project has been funded in whole or in part with Federal funds by the National Library of Medicine award number HHSN276201500011I awarded to the Center for Public Service Communications. Images from iStock.com.