

HIV 檢測結果呈陰性代表什麼？－ HIV 測試，第 6 部分

陰性結果並非始終準確。這要取決於您可能已接觸到 HIV 及進行檢測的時間。



結果不准的原因是病毒存在窗口期，即您可能已接觸到 HIV 之後、檢測可將其檢出前的時間段。窗口期取決於您採用的 HIV 檢測方法。

如果您在可能接觸 HIV 後 3 個月內進行抗體檢測，且結果呈陰性，請在 3 個月後再次檢測。

NAT 或核酸檢測的上述時間期限要更短一些。NAT 檢測也被稱作組合檢測、RNA 檢測或病毒載量檢測。

HIV 檢測檢出陰性結果後，向您的醫療保健提供者諮詢是否需要接受再次檢測，以及何時進行。

同時，請繼續採取如下等措施避免感染 HIV：

- 性交過程中使用安全套
- 避免與他人共用針頭或其他藥品器械或「注射用具」
- 如果您的 HIV 檢測呈陰性但屬 HIV 高危感染人群，請服用暴露前預防 (PrEP) 藥物，幫助預防 HIV 感染。



切記 - 陰性結果只能代表過去的病毒接觸安全。如果您的檢測結果呈陰性，但繼續參與高風險行為，那麼您仍面臨 HIV 感染風險。



若您對 HIV/AIDS 有任何疑問，請務必諮詢。您的公共健康部門、醫療保健提供者和公共圖書館會提供幫助。

Text is from HIV/AIDS sources from the Department of Health and Human Services and adapted by HealthReach and Healthy Roads Media. This project has been funded in whole or in part with Federal funds by the National Library of Medicine award number HHSN2762015000111 awarded to the Center for Public Service Communications. Images from iStock.com.