

女性和 HIV — 初診為感染 HIV，第 4 部分



男性和女性需要的 HIV 照護類型相似，但也存在一些重要差異：

- 女性經常因感染 HIV 而患上婦科疾病。這些疾病包括難治的陰道酵母菌感染、盆腔炎並會增加患子宮頸癌的可能性。
- 女性可能會對目前或未來的妊娠和分娩感到擔憂。建議您最好與您的提供者談談這些擔憂。
- 被診斷出感染 HIV 的女性應盡快接受子宮頸抹片檢查和盆腔檢查。這些女性應該在 6 個月後接受後續子宮頸抹片檢查。
- 女性的卡波西肉瘤發病率很低，這是在 HIV 發展為 AIDS 時出現的一種癌症。
- 女性通常在 HIV 感染階段後期才被確診，因此更容易受機會性感染的影響。它們被稱作機會性感染，或 OI，因為其伺機在您免疫系統薄弱時引發感染。
- 通常情況下，女性在接受 HIV 照護時不得不為自己和治療提供強大支援。女性經常面臨多重照護障礙，例如父母離異、收入有限以及對 HIV 抱有社會恥辱感或羞恥感。
- 不再擔心需要受孕的女性不大可能會使用避孕套或進行安全性行為。這會增加其 HIV 感染風險。



若您對 HIV/AIDS 有任何疑問，請務必諮詢。您的公共健康部門、醫療保健提供者和公共圖書館能提供幫助。

Text is from HIV/AIDS sources from the Department of Health and Human Services and adapted by HealthReach and Healthy Roads Media. This project has been funded in whole or in part with Federal funds by the National Library of Medicine award number HHSN276201500011I awarded to the Center for Public Service Communications. Images from iStock.com.