

開始服用 PrEP 前應了解哪些事項？— PrEP，第 3 部分



PrEP（暴露前預防）是易透過性行為或注射吸毒感染 HIV 的高危非感染者用藥。

PrEP（暴露前預防）是易透過性行為或注射吸毒感染 HIV 的高危非感染者用藥。PrEP 必須每天服用才能見效。

在開始使用 PrEP 前，您必須進行 HIV 檢測，以確定您尚未感染 HIV。在您服用 PrEP 期間，您必須每 2 至 3 個月拜訪一次您的醫療保健提供者，以接受追蹤治療。

許多健康保險計劃都承保 PrEP 的費用，商業藥物援助計劃還為低收入人群和沒有保險支付 PrEP 照護費的人士提供免費的 PrEP。

已接觸 HIV 之後，還能開始服用 PrEP 嗎？

不能。PrEP（預防前暴露）的服用人群只能是目前 HIV 檢測呈陰性的 HIV 感染高危人群。

PrEP 不會為您提供其他性傳播疾病 (STD) 防護。如果您因注射吸毒風險而服用 PrEP，那麼 PrEP 不會幫助您對抗 C 型肝炎或其他與毒品相關的感染。



雖然每天服用 PrEP 能極大降低 HIV 的感染風險，但您可以透過經常使用安全套等低風險行為進一步降低您的感染風險。



若您對 HIV/AIDS 有任何疑問，請務必諮詢。您的公共健康部門、醫療保健提供者和公共圖書館能提供幫助。

Text is from HIV/AIDS sources from the Department of Health and Human Services and adapted by HealthReach and Healthy Roads Media. This project has been funded in whole or in part with Federal funds by the National Library of Medicine award number HHSN2762015000111 awarded to the Center for Public Service Communications. Images from iStock.com.