

PrEP 需服用多久？— PrEP，第 6 部分

PrEP，或暴露前預防，是易透過性行為或注射吸毒感染 HIV 的高危非感染者用藥。

PrEP 必須每天服用才能見效。但也有幾個停止服用 PrEP 的原因。



例如，如果您因生活改變導致 HIV 感染風險變得較低，您可能希望停止服用 PrEP。請謹記，PrEP 只是 HIV 高風險人群用藥。

若要使 PrEP 起效，您必須：

- 每日服用 PrEP
- 每 2 至 3 個月接受一次醫療保健提供者的檢查

如果您發現自己不想每日服藥或經常忘記服藥，那麼其他對抗 HIV 感染的方法可能更適合您。




如果服用藥物出現副作用進而影響了您的生活，或如果血液檢查結果表明您的身體對 PrEP 出現反應，那麼您可能需要停止服用 PrEP。

每日服用 PrEP 很安全並對預防 HIV 感染有顯著成效。

在多數服用 PrEP 數年的 HIV 陰性人群中，尚未發現任何明顯的健康影響。

若您對 HIV/AIDS 有任何疑問，請務必諮詢。您的公共健康部門、醫療保健提供者和公共圖書館會提供幫助。



Text is from HIV/AIDS sources from the Department of Health and Human Services and adapted by HealthReach and Healthy Roads Media. This project has been funded in whole or in part with Federal funds by the National Library of Medicine award number HHSN276201500011I awarded to the Center for Public Service Communications. Images from iStock.com.