

HIV 如何實現母嬰傳播 — 懷孕，第 1 部分



母親感染 HIV 並不意味著孩子也將感染 HIV。在現代 HIV 治療技術應用前，美國大約有 1/4 的 HIV 測試呈陽性的孕婦將病毒傳播給體內嬰兒。

今天，如果孕婦服用 HIV 藥物且血液內未發現病毒，那麼她將 HIV 傳給嬰兒的風險不到 1%。但孕期和分娩時的母嬰傳播仍然是兒童感染 HIV 的最常見方式。這種傳播方式被稱為母嬰傳播或圍產期傳播。

HIV 測試呈陽性的母親可以透過三種方式將 HIV 傳播給嬰兒：

- **孕期內**

如果母親感染 HIV，就可能將 HIV 病毒傳播給子宮內的胎兒。


- **經陰道分娩過程中**

當嬰兒通過產道時，接觸到母親血液或其他體液內的 HIV。

- **透過母乳餵養**

母親可能會透過母乳將病毒傳播給嬰兒，即使她正確地服用 HIV 藥物。

還有報告稱，有些兒童因食用被 HIV 感染者咀嚼過的食物而被感染 HIV。不應向嬰兒餵食咀嚼過的食物。



若您對 HIV/AIDS 有任何疑問，請務必諮詢。您的公共健康部門、醫療保健提供者和公共圖書館能提供幫助。

Text is from HIV/AIDS sources from the Department of Health and Human Services and adapted by HealthReach and Healthy Roads Media. This project has been funded in whole or in part with Federal funds by the National Library of Medicine award number HHSN276201500011I awarded to the Center for Public Service Communications. Images from iStock.com.