

## HIV 測試和懷孕 — 懷孕，第 3 部分



藉助更多的 HIV 測試和新藥物，孕期、分娩和母乳餵養過程中感染 HIV 的嬰兒數目在過去 20 年間已減少了 90%。

父母雙方在打算懷孕前應接受 HIV 測試，即使之前已進行過測試。

此外，所有女性在孕早期的第一次產前護理檢查時都應接受 HIV 測試。

並非所有的醫療保健診所都為孕婦進行常規 HIV 測試。如果不提供 HIV 測試，請確保請求測試。


部分女性如有特定風險，應在孕期接受第二次 HIV 測試。這可能包括出現過可能使其面臨感染 HIV 之風險的行為。



如果孕婦生產前未接受過 HIV 測試，則應在產前進行快速 HIV 測試。這樣的話，如果測試結果為陽性，醫生可以幫助及避免 HIV 透過母親傳給嬰兒。如果母親的 HIV 測試結果為陽性，那麼孩子也應立即在出生後接受 HIV 測試。

HIV 測試呈陽性的母親選擇在照顧接觸過 HIV 的嬰兒方面有經驗的醫生或診所是非常有益的。他們會準確地知道嬰兒需要哪些後續測試以及這些測試應何時進行。

若您對 HIV/AIDS 有任何疑問，請務必諮詢。您的公共健康部門、醫療保健提供者和公共圖書館能提供幫助。



Text is from HIV/AIDS sources from the Department of Health and Human Services and adapted by HealthReach and Healthy Roads Media. This project has been funded in whole or in part with Federal funds by the National Library of Medicine award number HHSN2762015000111 awarded to the Center for Public Service Communications. Images from iStock.com.