

HIV 和新生兒 — 懷孕，第 5 部分

母親可能在孕期內分娩過程中、生產時或母乳餵養過程中將 HIV 傳播給嬰兒。值得欣慰的是有許多方法可以將 HIV 傳播給未出生嬰兒的風險下降到幾乎為零。



出生後的 6 到 12 小時內，由 HIV 感染者分娩出的嬰兒需服用名為齊多夫定或立妥威的 HIV 藥物。

HIV 藥物可保護嬰兒免遭任何可能在分娩時透過母嬰方式傳播的 HIV 感染。

由 HIV 感染者分娩出的嬰兒通常應在出生後的 14 到 21 天、1 到 2 個月，以及 4 到 6 個月分別進行 HIV 測試。



所採用的 HIV 測試名為病毒學測試，會直接檢查血液內的病毒。

至少需要兩次 HIV 病毒學測試的結果才能確定嬰兒是否感染有 HIV。

如果測試顯示嬰兒已感染 HIV，那麼所服用的藥物將從齊多夫定轉換為抗逆轉瀉病毒療法 (ART)，以作為終生 HIV 護理的一部分。

若您對 HIV/AIDS 有任何疑問，請務必諮詢。您的公共健康部門、醫療保健提供者和公共圖書館能提供幫助。



Text is from HIV/AIDS sources from the Department of Health and Human Services and adapted by HealthReach and Healthy Roads Media. This project has been funded in whole or in part with Federal funds by the National Library of Medicine award number HHSN2762015000111 awarded to the Center for Public Service Communications. Images from iStock.com.