

HIV 和母乳餵養 — 懷孕，第 6 部分

母親可能在孕期內、分娩過程中、生產時或母乳餵養過程中將 HIV 傳播給嬰兒。

如果您感染有 HIV，請勿母乳餵養。

強烈建議感染有 HIV 的母親使用嬰兒配方奶等母乳替代品，因為她有可能透過母乳餵養將病毒傳播給嬰兒。



母親可能會透過母乳餵養將 HIV 傳播給嬰兒，即使她正確地服用 HIV 藥物。



在美國，嬰兒配方奶是母乳餵養的安全而健康的替代選擇。

關於感染有 HIV 的母親之母乳餵養的建議，可能某些無法始終獲得清潔水的其他國家會有不同建議。

這是因為不純淨的水如果用於混合嬰兒配方奶，則有可能對嬰兒非常危險。因此不純淨水和 HIV 的風險都需要考慮到。

如果您有興趣，還可以與您的醫生、助產士或兒科醫師討論從母乳銀行獲取人乳。然而，這會非常昂貴。

若您對 HIV/AIDS 有任何疑問，請務必諮詢。您的公共健康部門、醫療保健提供者和公共圖書館能提供幫助。



Text is from HIV/AIDS sources from the Department of Health and Human Services and adapted by HealthReach and Healthy Roads Media. This project has been funded in whole or in part with Federal funds by the National Library of Medicine award number HHSN2762015000111 awarded to the Center for Public Service Communications. Images from iStock.com.