

## 藥物使用是如何與 HIV 相關聯的？— 物質濫用，第 1 部分



藥物使用在 HIV 傳播方面發揮著重要作用。舉例來說，美國的注射藥物使用每年可導致大約 10% 的 HIV 感染病例的出現。

如果您注射藥物，就會可能因與感染 HIV 的患者共用藥物備制和注射器具或「用品」而感染 HIV。

這就是 HIV 在您、與您共用藥物的人，以及您的性伴侶之間傳播的方式。服用藥物可能不僅會增加您感染 HIV，還會增大您感染其他性傳播疾病 (STD) 的風險。

神志不清醒會影響您做出安全選擇的能力並增加您承擔風險的幾率。這可能包括不戴避孕套的性行為或與多個性伴侶發生性行為。

以性交易換取藥物或金錢也可能增加您感染 HIV 的風險。如果您使用藥物，則感染 HIV 的風險就更大並應接受測試。



如果您已感染 HIV，那麼服用藥物可能會影響您的免疫系統並可能令您的 HIV 感染狀況變得更糟。

服用藥物還可能影響您的 HIV 治療依從性，它指的是每天正確服用您的藥物。當您在神志不清醒時，可能會忘記按時服用藥物或徹底忘記服用藥物。



若您對 HIV/AIDS 有任何疑問，請務必諮詢。您的公共健康部門、醫療保健提供者和公共圖書館能提供幫助。

Text is from HIV/AIDS sources from the Department of Health and Human Services and adapted by HealthReach and Healthy Roads Media. This project has been funded in whole or in part with Federal funds by the National Library of Medicine award number HHSN276201500011I awarded to the Center for Public Service Communications. Images from iStock.com.