

酒精是如何與 HIV 相關聯的？— 物質濫用，第 2 部分

酒精使用和濫用可能會增加 HIV/AIDS 的傳播。它還可能會影響感染 HIV 的患者的治療。飲酒，尤其是**酗酒**，可能會增加您感染 HIV 的風險。



喝醉會影響您做出安全選擇的能力並增加您承擔風險的機率。這可能會導致您做出在清醒狀態下不太可能做出的事情，例如不戴避孕套發生性行為。

這種危險行為可能增加您被感染 HIV 和其他性傳播疾病 (STD) 的機率。



重度飲酒可能導致您判斷力變差。這可能導致您延遲接受 HIV 測試。然後，如果您的 HIV 測試呈陽性，那麼酒精濫用可能導致您延遲啟動治療，因為您無法清晰地思考。

酒精濫用還可能令您很難遵守治療 HIV/AIDS 所需的複雜服藥時間表。

酒精濫用可能導致肝臟疾病和其他可能令 HIV 疾病惡化的醫療狀況。

若您對 HIV/AIDS 有任何疑問，請務必諮詢。您的公共健康部門、醫療保健提供者和公共圖書館能提供幫助。



Text is from HIV/AIDS sources from the Department of Health and Human Services and adapted by HealthReach and Healthy Roads Media. This project has been funded in whole or in part with Federal funds by the National Library of Medicine award number HHSN276201500011I awarded to the Center for Public Service Communications. Images from iStock.com.