

常見的濫用藥物和 HIV 風險 — 物質濫用，第 5 部分

濫用**類鴉片藥物**的流行已經將新的一群人置於不斷增加的 HIV 感染風險之中。這種流行包括處方類鴉片藥物濫用和海洛因使用。



農村地區和小城市居民過去感染 HIV 的風險很低。隨著這些地區受類鴉片藥物流行的影響，越來越多的人被感染 HIV。這些地區通常很少有能夠幫助本地人群的 HIV 和藥物濫用治療服務。



古柯鹼會讓您面臨 HIV 感染的風險，因為它可能導致您做出不明智的決策。這可能會導致危險性行為。購買古柯鹼會快速地花光您的積蓄。然後您可能會轉向性交易來獲取藥物或金錢。這會增加您的 HIV 感染風險。與非使用者相比，古柯鹼使用者報告有更多的近期和終生性伴侶。此外，古柯鹼使用者會更少地在 HIV 預防計劃中獲得成功。

甲基苯丙胺或「冰毒」可能會干擾您的判斷。這會增加您透過性行為和注射藥物使用感染 HIV 的風險。對於擁有男士性伴侶的男性來說，冰毒的使用和 HIV 感染之間存在著緊密的關聯。冰毒還可能令 HIV 感染者的 HIV 疾病狀況惡化。

如搖頭丸、K 他命和 GHB 等「**俱樂部藥物**」可以改變您的判斷。服用俱樂部藥物後，您更有可能發生計劃外的無保護性行為或使用其他藥物。這些行為會增加您 HIV 感染的風險。

使用硝酸戊酯吸入劑，又稱「**春藥**」，也可能導致 HIV 感染風險增加。春藥與風險性行為、非法藥物使用，以及同性戀和雙性戀男性間的性傳播疾病的感染相關聯。春藥還越來越多地被青少年所使用。

若您對 HIV/AIDS 有任何疑問，請務必諮詢。您的公共健康部門、醫療保健提供者和公共圖書館能提供幫助。



Text is from HIV/AIDS sources from the Department of Health and Human Services and adapted by HealthReach and Healthy Roads Media. This project has been funded in whole or in part with Federal funds by the National Library of Medicine award number HHSN276201500011I awarded to the Center for Public Service Communications. Images from iStock.com.