

## 物質濫用和 HIV 測試 — 物質濫用，第 6 部分



如果您上一次的 HIV 測試結果為陰性並且符合下列任何一種情況，則應接受 HIV 測試。

- 您是否曾注射過藥物，然後與他人共用針頭和藥物備制器具或「用品」？
- 您是否曾為藥物或金錢而因性行為交易？
- 您是否曾與不瞭解其藥物使用史的某人發生過性關係？

如果您繼續出現任何一種行為，則應至少每年進行一次測試。

擔心被捕、負罪感和自尊心低可能會阻礙藥物濫用者接受 HIV 測試或治療。這會將他們置於更高的 HIV 感染風險中。如果他們感染有 HIV，那麼藥物濫用還會增加其將 HIV 傳播給他人的風險。

與您的醫療健保提供商討論接受 HIV 測試。您也可以到 HIV 測試地點接受測試。

瞭解哪些類型的 HIV 測試可用。有些測試可以在您被感染後快速地檢測到 HIV。其他測試會花費較長時間才能得出準確結果。您在家中就可以進行一些具有醫療準確性的 HIV 測試。



若您對 HIV/AIDS 有任何疑問，請務必諮詢。您的公共健康部門、醫療保健提供者和公共圖書館能提供幫助。

Text is from HIV/AIDS sources from the Department of Health and Human Services and adapted by HealthReach and Healthy Roads Media. This project has been funded in whole or in part with Federal funds by the National Library of Medicine award number HHSN276201500011I awarded to the Center for Public Service Communications. Images from iStock.com.