

HIV 和藥物濫用 — PEP 和 PrEP 的作用 — 藥物濫用，第 7 部分



「**PrEP**」代表暴露前預防。PrEP 是一種幫助未感染 HIV 但卻有極高感染風險的人士避免 HIV 感染的藥物。

PrEP 僅可由醫療健保提供商開具，因此請與您的提供商討論，以瞭解這是不是適合您的 HIV 感染預防策略。

如果您曾在過去 6 個月內注射過藥物並出現過下列情況，則推薦您使用 PrEP：

- 在過去 6 個月內共用過針頭或注射器具，或
- 在過去 6 個月內參加過藥物治療計劃。

「**PEP**」代表暴露後預防。PEP 是一種在可能的近期病毒接觸後避免 HIV 感染的藥物。如果您認為自己可能已透過共用的針頭或藥物備制器具來使用藥物，從而接觸到 HIV，請立即與您的醫療健保提供商或急診室醫生討論 PEP。



PEP 應僅在緊急狀況下使用。它必須在可能的 HIV 接觸後 72 小時內開始服用。

PEP 和 PrEP 的作用效果都很好，但也並非 100% 有效。您在服藥期間應停止使用藥物。如果您無法停止，請確保不會共用針頭或藥物器具。

請與您的藥物共用夥伴討論如何降低 HIV 感染風險及 PEP 和 PrEP。



若您對 HIV/AIDS 有任何疑問，請務必諮詢。您的公共健康部門、醫療保健提供者和公共圖書館能提供幫助。

Text is from HIV/AIDS sources from the Department of Health and Human Services and adapted by HealthReach and Healthy Roads Media. This project has been funded in whole or in part with Federal funds by the National Library of Medicine award number HHSN276201500011I awarded to the Center for Public Service Communications. Images from iStock.com.