

## 부작용 - HIV 의약품, 파트 3



HIV 치료, 즉 항레트로바이러스 요법 또는 ART는 HIV 약들의 조합이며, 이를 HIV 요법이라고 합니다. HIV 약들은 HIV 감염자들을 더 오래, 건강하게 살 수 있도록 도와주지만, 부작용을 유발할 수도 있습니다. 대부분의 부작용은 경증이지만, 일부는 심각할 수도 있습니다.

다양한 HIV 약들이 다양한 부작용을 유발할 수 있습니다. 같은 HIV 약을 복용하는 사람의 경우도 부작용은 매우 다르게 나타날 수 있습니다.

여러 새로운 HIV 약들은 이전의 HIV 약보다 부작용이 더 적습니다. 담당 의료제공자가 귀하와 함께 HIV 요법에 포함될 최선의 약들을 결정합니다.

HIV 약을 복용하고 있다면, 부작용에 대해 의료제공자에게 알려주세요. 두통이나 가끔 나타나는 어지러움 등의 일부 부작용은 심각하지 않을 수 있습니다. 하지만, 얼굴, 눈, 입술, 목구멍 또는 혀가 붓는 것은 매우 중대한 부작용으로 즉각적인 의학적 치료가 필요합니다.



때로는 이러한 부작용이 HIV 약과 전혀 관계가 없을 수도 있습니다. 부작용은 HIV가 아닌 치료할 수 있는 감염과 같은 다른 의학적 상태로 인해 발생할 수도 있습니다. 의료제공자는 부작용이 HIV 약으로 인한 것인지 또는 다른 상태로 인한 것인지 알 수 있습니다.

부작용은 단 며칠 또는 몇 주간만 지속될 수 있고, 또는 더 오래 지속될 수도 있습니다. HIV 약의 복용을 시작한 후 몇 달 또는 몇 년 동안 부작용이 나타나지 않을 수도 있습니다. 부작용을 줄이기 위해 의료제공자가 HIV 약을 변경할 수 있습니다. HIV 요법에 포함될 수 있는 HIV 약을 많습니다.



의료제공자가 지시하지 않는 한 HIV 약의 용량을 줄이거나, 복용을 건너 뛰거나 중단하지 마세요.

HIV/AIDS에 대한 질문이 있으시면 꼭 답변을 듣도록 하세요. 공중 보건국, 의료제공자 및 공공도서관에서 도움을 받을 수 있습니다.

Text is from HIV/AIDS sources from the Department of Health and Human Services and adapted by HealthReach and Healthy Roads Media. This project has been funded in whole or in part with Federal funds by the National Library of Medicine award number HHSN276201500011I awarded to the Center for Public Service Communications. Images from iStock.com.