

HIV 의약품과 여성 - HIV 의약품, 파트 7

HIV 치료, 즉 항레트로바이러스 요법 또는 ART는 HIV 약들의 조합이며, 이를 HIV 요법이라고 합니다. ART는 HIV에 감염된 모든 사람에게 권장됩니다.



의료제공자가 제공하는 HIV약에 대한 조언은 남성 및 여성에 대해 대부분 동일합니다. 하지만 여성의 경우 HIV 치료에 영향을 줄 수 있는 몇 가지 특별한 문제가 있습니다.

부작용

HIV 약의 일부 부작용은 남성에서보다 여성에서 더 자주 또는 더 심하게 발생할 수 있습니다.



피임


일부 HIV 약은 피임정, 패치, 링 또는 이식제와 같은 호르몬 피임제의 효과를 줄일 수 있습니다. 이러한 HIV 약을 복용하는 여성은 추가 피임법을 사용하거나 다른 피임법을 사용해야 할 수 있습니다.

임신

HIV에 감염된 여성은 임신 및 출산 중 아기에게 HIV가 전염될 위험을 낮추기 위해 HIV 약을 복용합니다. 이를 통해 여성의 건강도 보호됩니다. 임신 중의 변화는 신체가 HIV 약을 사용하는 방식에 영향을 줄 수 있으므로, 임신 중에는 HIV 약의 용량을 변경할 수도 있습니다. HIV 약의 일부 부작용으로 인해 임신 중 HIV 요법을 준수하는 것이 더 어려울 수 있습니다.

HIV 약 중 선천적 결함과 분명한 관련을 갖는 것은 없지만, 일부 약에 대해서는 우려가 제기된 바 있습니다.

임산부와 의료제공자는 임신 중 안전하고 효과가 좋은 HIV 요법을 위한 약의 선택을 위해 협력할 수 있습니다.



HIV/AIDS에 대한 질문이 있으시면 꼭 답변을 듣도록 하십시오. 공중 보건국, 의료제공자 및 공공도서관에서 도움을 받을 수 있습니다.

Text is from HIV/AIDS sources from the Department of Health and Human Services and adapted by HealthReach and Healthy Roads Media. This project has been funded in whole or in part with Federal funds by the National Library of Medicine award number HHSN276201500011I awarded to the Center for Public Service Communications. Images from iStock.com.