

HIV 의약품과 노인 - HIV 의약품, 파트 8



미국의 경우 거의 HIV 감염자 4명 중 1명이 55세 이상입니다. 항레트로바이러스 요법 또는 ART라고 하는 HIV 약의 투여는 모든 HIV 감염자에게 중요합니다. HIV 약을 평생 투여하는 경우, HIV에 감염된 고령자가 더 오래 건강한 삶을 사는 데 도움이 됩니다.

HIV 치료에 대한 조언은 노인 및 젊은 사람에서 동일합니다. 하지만, 연령과 관련된 문제가 노인의 HIV 치료에 영향을 줄 수 있습니다.

나이가 들어감에 따라 간과 신장이 기능을 잘 하지 못합니다. 이로 인해 신체가 HIV 약을 사용하는 것이 어려워질 수 있고 부작용 위험이 높아집니다. HIV에 감염된 노인에게 당뇨병 또는 심장질환과 같은 다른 질병상태가 있을 수도 있습니다.

또한 HIV가 신체의 노화에 영향을 줄 수도 있습니다. HIV는 치매 및 일부 암과 같은 연령과 관련한 질병상태 발생 위험을 증가시킵니다.

HIV를 위한 약과 다른 질병상태를 위한 약들을 동시에 복용하면 각각에 대해 약물이 반응할 위험이 높아질 수 있습니다. 이를 약물-약물 상호작용이라고 합니다. 상호작용은 약의 부작용을 증가시킬 수도 있습니다.



ART를 시작한 후 면역체계가 노인의 경우 젊은 사람들에게서만큼 빨리 회복되지 않을 수 있습니다.



이러한 문제들에도 불구하고, 복약 순응도는 젊은 사람들에서보다 노인에서 더 좋습니다. 복약 순응도란 HIV 약을 매일, 그리고 처방된 대로 정확히 복용하는 것을 말합니다.

HIV/AIDS에 대한 질문이 있으시면 꼭 답변을 듣도록 하십시오. 공중 보건국, 의료제공자 및 공공도서관에서 도움을 받을 수 있습니다.

Text is from HIV/AIDS sources from the Department of Health and Human Services and adapted by HealthReach and Healthy Roads Media. This project has been funded in whole or in part with Federal funds by the National Library of Medicine award number HHSN276201500011I awarded to the Center for Public Service Communications. Images from iStock.com.