

누가 HIV 검사를 받아야 하나요? - HIV 검사, 파트 2

13~64세의 모든 사람들이 최소 1회의 HIV 검사를 받는 것이 권장됩니다.

또한 HIV 감염 위험이 높은 사람들에게 검사가 권장됩니다. 이러한 위험은 다음과 같습니다:

- HIV 양성 또는 HIV 감염 상태를 알지 못하는 사람과 콘돔을 사용하지 않고 성관계를 하는 경우
- 마약을 주사하고 바늘, 주사기 또는 다른 마약 기구를 다른 사람과 공유하는 경우
- 돈이나 마약을 위해 성매매를 하는 경우
- STD 또는 성매개질환이 있는 경우 STD는 매독, 임질 및 클라미디아 등 20여종 이상이 있습니다.
- 간염 또는 결핵(tuberculosis, TB)에 걸린 경우
- 여기 기재된 HIV 위험인자가 있는 사람과 성관계를 하는 경우



모든 임산부는 가능한 임신 초기에 HIV 검사를 받아야 합니다. 과거에 검사를 받았던 경우에도 검사를 받아야 합니다.

성폭행을 당했다면, 폭행 이후 가능한 빨리 HIV 검사를 받아야 합니다.

새로운 파트너와 처음 성관계를 하기 전, 파트너 모두 자신의 성관계 및 약물 사용 이력에 대해 솔직하게 이야기해야 합니다. HIV 상태에 대해 이야기하고 성관계를 하기 전 HIV 검사를 받는 것을 고려해야 합니다. 검사에서 음성이 나온 사람은 자신의 파트너 역시 HIV에 음성이어야 한다고 생각합니다. 하지만 HIV 검사에서는 파트너가 아닌 귀하의 상태만 확인됩니다.

귀하의 HIV 감염 위험과 HIV 검사에 대해 의료제공자와 상담하시기 바랍니다.

HIV/AIDS에 대한 질문이 있으시면 꼭 답변을 듣도록 하십시오. 공중 보건국, 의료제공자 및 공공도서관에서 도움을 받을 수 있습니다.



Text is from HIV/AIDS sources from the Department of Health and Human Services and adapted by HealthReach and Healthy Roads Media. This project has been funded in whole or in part with Federal funds by the National Library of Medicine award number HHSN276201500011 awarded to the Center for Public Service Communications. Images from iStock.com.