

## HIV 검사는 얼마나 자주 받아야 하나요? - HIV 검사, 파트 3

### 1회

13세와 64세 사이의 모든 사람이 정규 건강관리의 일환으로 최소 1회의 HIV 검사를 받아야 합니다.

### 연 1회 이상

성적 위험 또는 주사 물질 사용과 같은 특정 위험인자가 있는 사람의 경우, 이러한 위험이 지속되는 한.



### 연 2~3회

여러 파트너와 성관계를 하는 경우, 콘돔을 사용하지 않는 경우, 불법 마약을 사용하는 경우, 주사바늘을 공유하는 경우 등과 같이 매우 위험한 행동을 하는 사람의 경우.

### HIV 검사는 언제 받아야 하나요?


HIV에 노출되었을 수 있다고 생각된다면 검사를 받으십시오. 하지만 즉시 검사를 하는 경우 HIV 초기 감염이 나타나지 않을 수도 있습니다.



감염 직후 HIV 검사를 받는 경우, 귀하가 HIV에 감염되지 않은 것으로 나올 수도 있습니다. 이는 일부 HIV 검사에서는 외부 침입자에 대한 신체의 자연적인 면역반응인 항체를 살펴보기 때문입니다. 체내에서 아직 HIV에 대한 항체가 만들어지지 않았을 수도 있습니다.

HIV에 감염되면, 신체는 보통 3~12주 사이에 항체를 만들기 시작합니다. HIV에 노출된 시점과 항체가 발생하는 시점 사이의 기간을 "미검출 기간(window period)"이라고 합니다.

바이러스에 노출된 후 조기에 HIV 양성 여부를 알 수 있는 보다 새로운 HIV 검사도 이용할 수 있습니다. 새로운 검사 중 하나에서는 혈중 HIV의 양을 의미하는 바이러스 부하를 검사하여 바이러스 자체를 살펴봅니다. 이 검사는 바이러스에 노출된 후 9~11일 이내에 HIV를 검출할 수 있습니다.



HIV/AIDS에 대한 질문이 있으시면 꼭 답변을 듣도록 하십시오. 공중 보건국, 의료제공자 및 공공도서관에서 도움을 받을 수 있습니다.

Text is from HIV/AIDS sources from the Department of Health and Human Services and adapted by HealthReach and Healthy Roads Media. This project has been funded in whole or in part with Federal funds by the National Library of Medicine award number HHSN276201500011I awarded to the Center for Public Service Communications. Images from iStock.com.