

HIV가 산모로부터 아기에게 전파되는 방법 - 임신, 파트 1



산모가 HIV에 감염되었다고 해서 아기도 HIV에 감염되는 것은 아닙니다. 미국에서, 현대적 HIV 치료가 가능하기 전에는 HIV 양성 임산부 4명 중 1명이 바이러스를 아기에게 전염시켰습니다.

오늘날에는 임산부가 HIV 약을 복용하고 혈중에서 바이러스가 발견되지 않는다면, 아기에게 HIV가 전염될 위험은 1% 미만입니다. 여전히 임신 및 출산 중 산모로부터 아기로의 HIV 전염이 소아가 HIV에 감염되는 가장 일반적인 방식입니다. 이를 모자감염(mother-to-child transmission) 또는 주산기 감염(perinatal transmission)이라고 합니다.

HIV 양성 산모는 3가지 방식으로 아기에게 HIV를 감염시킬 수 있습니다:

- **임신 중**

산모가 감염되면, 아기가 자궁에 있는 동안 HIV 바이러스를 아기에게 전염시킬 수 있습니다.

- **질식 분만 중**

아기가 산도를 통과할 때 산모의 혈액 또는 기타 체액의 HIV에 노출됩니다..

- **수유를 통해**

산모가 HIV 약을 정확히 복용하고 있는 경우에도, 모유를 통해 아기에게 바이러스가 전염될 수 있습니다.



HIV 감염자가 씹었던 음식을 먹어서 아동이 HIV에 감염되었다는 보고가 있습니다. 아기에게 미리 씹은 음식을 먹여서는 안 됩니다.



HIV/AIDS에 대한 질문이 있으시면 꼭 답변을 듣도록 하십시오. 공중 보건국, 의료제공자 및 공공도서관에서 도움을 받을 수 있습니다.

Text is from HIV/AIDS sources from the Department of Health and Human Services and adapted by HealthReach and Healthy Roads Media. This project has been funded in whole or in part with Federal funds by the National Library of Medicine award number HHSN2762015000111 awarded to the Center for Public Service Communications. Images from iStock.com.