

## HIV 검사와 임신 - 임신, 파트 3

HIV 검사와 신약이 늘어남에 따라, 지난 20년간 임신, 출산 및 모유 수유 중 HIV에 감염된 아기의 수가 90%까지 감소되었습니다.



전에 검사를 받았었다 하더라도, 임신을 계획 중이라면 어머니와 아버지 모두 HIV 검사를 받아야 합니다.

또한 모든 여성들은 임신 초기 첫 번째 산전관리 방문에서 HIV에 대한 검사를 받아야 합니다.

모든 의료 클리닉에서 임신부를 대상으로 HIV 검사를 일반적으로 실시하는 것은 아닙니다. 검사가 제공되지 않는지 확인하십시오.


일부 여성은 특정 위험이 있다면 이후 임신 중에 2차 HIV 검사를 받아야 합니다. 특정 위험이란 HIV 감염 위험이 높은 행동 등일 수 있습니다.



임산부가 HIV 검사를 받지 않고 출산을 하는 경우, 분만실에서 신속 HIV 검사를 받아야 합니다. 검사에서 양성인 경우, 의사들이 산모로부터 아기에게 HIV가 전염되는 것을 방지할 수 있습니다. 산모가 HIV 양성인 경우, 출생 직후 아기에게 HIV 검사를 해야 합니다.

HIV 양성 산모의 경우 HIV에 노출된 아기를 치료한 경험이 있는 의사나 클리닉을 선택하는 것이 좋습니다. 이들은 아기에게 필요한 후속 검사가 정확히 무엇이며 그러한 검사를 언제 실시해야 하는지 알고 있습니다.

HIV/AIDS에 대한 질문이 있으시면 꼭 답변을 듣도록 하십시오. 공중 보건국, 의료제공자 및 공공도서관에서 도움을 받을 수 있습니다.



Text is from HIV/AIDS sources from the Department of Health and Human Services and adapted by HealthReach and Healthy Roads Media. This project has been funded in whole or in part with Federal funds by the National Library of Medicine award number HHSN2762015000111 awarded to the Center for Public Service Communications. Images from iStock.com.