

마약 사용과 HIV는 어떤 관계가 있나요? - 약물 남용, 파트 1



마약 사용은 HIV 전파에 주된 역할을 할 수 있습니다. 예를 들어, 미국의 경우 매년 HIV 사례의 대략 10%가 주사용 마약 사용에 의한 것입니다.

마약을 주사하는 경우, HIV 감염자와 마약 준비 및 주사 기구 또는 "마약 주사 기구 세트(works)"를 공유하면 귀하가 HIV에 감염될 수 있습니다.

이것이 귀하, 귀하가 함께 마약을 사용하는 사람 및 귀하의 성적 파트너 사이에서 HIV가 전파될 수 있는 방식입니다. 마약의 사용은 HIV뿐 아니라 다른 성매개질환 또는 STD에 걸릴 위험을 증가시킬 수 있습니다.

마약에 취하면 안전한 선택을 하는 능력에 영향을 받아 위험을 감수할 가능성이 늘어납니다. 즉, 콘돔을 사용하지 않는 성관계 또는 여러 파트너와의 성관계를 하는 것 등입니다.

마약이나 돈을 대가로 한 성매매 역시 HIV에 감염될 기회를 증가시킬 수 있습니다. 마약을 사용한다면, HIV에 대한 위험이 높습니다. 따라서 검사를 받아야 합니다.



이미 HIV에 감염되었다면, 마약 사용이 면역체계에 영향을 미칠 수 있어 HIV 감염이 악화될 수 있습니다.

마약 사용은 또한 HIV 치료 준수(약을 매일 정확하게 복용하는 것)에도 영향을 미칠 수 있습니다. 마약에 취해 있는 동안 제 시간에 또는 아예 약을 복용하는 것을 잊어버리게 될 수 있습니다.



HIV/AIDS에 대한 질문이 있으시면 꼭 답변을 듣도록 하십시오. 공중 보건국, 의료제공자 및 공공도서관에서 도움을 받을 수 있습니다.

Text is from HIV/AIDS sources from the Department of Health and Human Services and adapted by HealthReach and Healthy Roads Media. This project has been funded in whole or in part with Federal funds by the National Library of Medicine award number HHSN276201500011I awarded to the Center for Public Service Communications. Images from iStock.com.