

## 알코올과 HIV는 어떤 관계가 있나요? - 약물 남용, 파트 2

음주 및 알코올 남용은 HIV/AIDS의 전파를 증가시킬 수 있습니다. 또한 HIV 감염자의 치료에도 영향을 미칠 수 있습니다. 음주, 특히 *과음*은 HIV에 대한 위험을 증가시킬 수 있습니다.



만취는 안전한 선택을 하는 능력에 영향을 주며 위험을 감수할 가능성을 증가시킵니다. 이로 인해 콘돔을 사용하지 않고 성관계를 하는 것과 같이 술에 취하지 않았을 때는 하지 않을 행동을 할 수도 있습니다.

이러한 종류의 위험한 행동은 HIV 및 다른 성매개질환 또는 STD에 걸릴 가능성을 높일 수 있습니다.




과음은 판단력을 흐리게 할 수 있습니다. 이로 인해 HIV에 대한 검사가 지연될 수도 있습니다. 이후 HIV 검사에서 양성으로 나오면, 알코올 남용으로 명료한 판단을 하지 못하므로 치료 시작이 늦어질 수 있습니다.

알코올 남용은 또한 HIV/AIDS 치료에 종종 필요한 복잡한 투약일정 준수를 어렵게 만들 수도 있습니다.

알코올 남용은 간질환을 유발할 수 있으며 HIV 질환을 악화시킬 수 있는 기타 의학적 문제를 초래할 수 있습니다.

HIV/AIDS에 대한 질문이 있으시면 꼭 답변을 듣도록 하십시오. 공중 보건국, 의료제공자 및 공공도서관에서 도움을 받을 수 있습니다.



Text is from HIV/AIDS sources from the Department of Health and Human Services and adapted by HealthReach and Healthy Roads Media. This project has been funded in whole or in part with Federal funds by the National Library of Medicine award number HHSN2762015000111 awarded to the Center for Public Service Communications. Images from iStock.com.