

## 약물 남용과 HIV 검사 - 약물 남용, 파트 6

지난번 검사에서 HIV 음성이었지만 다음 질문 중 하나에 해당한다면, HIV 검사를 받아야 합니다.



- ¿마약을 주사한 후 주사바늘과 마약 준비 기구 또는 "마약 주사 기구 세트(works)"를 다른 사람과 공유한 적이 있습니까?
- 마약이나 돈을 대가로 성매매를 한 적이 있습니까?

- 마약 사용 과거력을 모르는 누군가와 성관계를 한 적이 있습니까?

이러한 사항 중 하나라도 계속하는 경우 적어도 연 1회 검사를 받아야 합니다.

물질 남용자들은 체포에 대한 두려움, 죄책감 및 낮은 자존감으로 인해 HIV 검사를 받거나 치료를 받지 못할 수 있습니다. 이로 인해 HIV에 대한 위험이 더 커집니다. HIV에 감염된 경우, 물질 남용은 이를 다른 사람에게 전파시킬 위험도 증가시킵니다.

HIV 검사에 대해 담당 의료제공자와 상담을 하십시오. HIV 검사기관에서 검사를 받을 수도 있습니다.

어떤 종류의 HIV 검사를 받을 수 있는지 알아보십시오. 감염 직후 HIV를 검출할 수 있는 검사가 있으며, 정확한 결과를 얻기 위해 시간이 더 많이 걸리는 검사도 있습니다. 어떤 종류의 HIV 검사를 받을 수 있는지 알아보십시오. 감염 직후 HIV를 검출할 수 있는 검사가 있으며, 정확한 결과를 얻기 위해 시간이 더 많이 걸리는 검사도 있습니다.



HIV/AIDS에 대한 질문이 있으시면 꼭 답변을 듣도록 하십시오. 공중 보건국, 의료제공자 및 공공도서관에서 도움을 받을 수 있습니다.

Text is from HIV/AIDS sources from the Department of Health and Human Services and adapted by HealthReach and Healthy Roads Media. This project has been funded in whole or in part with Federal funds by the National Library of Medicine award number HHSN276201500011I awarded to the Center for Public Service Communications. Images from iStock.com.