

HIV와 약물 남용 - PEP와 PrEP의 역할 - 약물 남용, 파트 7



"PrEP"는 노출 전 예방요법(**pre-exposure prophylaxis**)의 약자입니다. PrEP는 HIV에 감염되지 않았지만 감염될 위험이 매우 높은 사람을 위해 HIV 감염을 예방하는 약입니다.

PrEP는 의료제공자만 처방할 수 있으므로, PrEP가 귀하를 위한 적합한 HIV 예방 전략인지 알아보려면 담당 의료제공자와 상담하시기 바랍니다.

지난 6개월 이내에 주사용 마약을 사용했었고 다음과 같은 경우에 해당한다면 PrEP가 권장됩니다:

- 지난 6개월 이내에 주사바늘 또는 주사 기구를 공유한 적이 있거나,
- 지난 6개월에 마약치료 프로그램에 참여했던 경우.

"PEP"는 노출 후 예방요법(**post-exposure prophylaxis**)의 약자입니다.

PEP는 최근 가능한 바이러스 노출 후 HIV 감염을 예방하는 약입니다. 주사바늘 또는 마약 준비 기구를 공유하는 마약 사용을 통해 HIV에 노출되었을 수도 있다고 생각되는 경우, 즉시 담당 의료제공자 또는 응급실 의사와 PEP에 대해 상담하십시오.



PEP는 응급 상황에서만 사용해야 합니다. PEP는 HIV에 대한 가능한 노출 후 72시간 이내에 시작해야 합니다.

PEP와 PrEP 모두 효과가 매우 좋지만, 100% 효과적인 것은 아닙니다. 약을 복용하는 동안에는 마약 사용을 중단해야 합니다. 마약 사용을 중단할 수 없다면, 주사바늘이나 마약 기구를 공유하지 않도록 하십시오.

마약을 공유하는 파트너와 HIV 위험을 낮추는 방법과 PEP 및 PrEP에 대해 이야기하십시오.



HIV/AIDS에 대한 질문이 있으시면 꼭 답변을 듣도록 하십시오. 공중 보건국, 의료제공자 및 공공도서관에서 도움을 받을 수 있습니다.

Text is from HIV/AIDS sources from the Department of Health and Human Services and adapted by HealthReach and Healthy Roads Media. This project has been funded in whole or in part with Federal funds by the National Library of Medicine award number HHSN276201500011I awarded to the Center for Public Service Communications. Images from iStock.com.