

## Какова связь между алкоголем и ВИЧ? – Злоупотребление наркотическими веществами, часть 2

Употребление и злоупотребление алкоголем могут способствовать распространению ВИЧ и СПИДа. Это также может повлиять на лечение людей, инфицированных ВИЧ. Употребление алкоголя, особенно **чрезмерное**, может увеличить риск заражения ВИЧ.



Состояние алкогольного опьянения влияет на вашу способность делать безопасный выбор и увеличивает вероятность рискованных поступков. Это может привести к тому, что вы будете делать то, что вряд ли делали бы в трезвом состоянии, например, занятие сексом без презерватива.

Такое рискованное поведение может увеличить ваши шансы на заражение ВИЧ и другими заболеваниями, передающимися половым путем, или ЗППП.



Чрезмерное употребление алкоголя может повлиять на вашу способность принимать обдуманные решения. Это может привести к задержке в тестировании на ВИЧ. Далее, при положительном результате анализа на ВИЧ вследствие злоупотребления алкоголем вы можете отсрочить начало лечения из-за неспособности трезво мыслить.

Злоупотребление алкоголем может также усложнить для вас следование сложным графикам приема лекарств, которые часто необходимы для лечения ВИЧ и СПИДа.

Злоупотребление алкоголем может вызвать заболевание печени и другие проблемы со здоровьем, что может усилить активность вашего ВИЧ.

Обязательно получите ответы на любые вопросы, возникшие у вас относительно ВИЧ или СПИДа. В этом вам могут помочь ваш местный отдел общественного здравоохранения, врач и публичная библиотека.



Text is from HIV/AIDS sources from the Department of Health and Human Services and adapted by HealthReach and Healthy Roads Media. This project has been funded in whole or in part with Federal funds by the National Library of Medicine award number HHSN2762015000111 awarded to the Center for Public Service Communications. Images from iStock.com.