

Наиболее часто употребляемые наркотические вещества и риск заражения ВИЧ – Злоупотребление наркотическими веществами, часть 5

Эпидемия **злоупотребления** опиоидами подвергает все новые группы людей повышенному риску заражения ВИЧ. Эта эпидемия включает в себя как злоупотребление рецептурными опиоидами, так и употребление героина.



Жители сельских местностей и небольших городов ранее подвергались минимальному риску заражения ВИЧ. Поскольку эти районы затронула опиоидная эпидемия, все больше людей заражаются ВИЧ. Чаще всего для оказания помощи людям, живущим в этих местностях, доступно ограниченное количество услуг по лечению ВИЧ и злоупотреблению наркотическими веществами.



Кокаин подвергает человека риску заражения ВИЧ, поскольку его употребление может повлиять на принятие трезвых решений. Это может привести к рискованному сексуальному поведению. Плата за кокаин может быстро истощить бюджет, после чего человек может заняться торговлей сексом в обмен на наркотики или деньги. Это увеличивает риск заражения ВИЧ. По сравнению с лицами, употребляющими другие наркотики, у тех, кто употребляет кокаин, наблюдается большее количество новых и постоянных секс-партнеров. Кроме того, лица, употребляющие кокаин, менее успешно участвуют в программах профилактики ВИЧ.

Метамфетамин, или «мет» может повлиять на способность человека принимать трезвые решения. Это увеличивает риск заражения ВИЧ как через секс, так и инъекционные наркотики.

Существует тесная связь между употреблением метамфетамина и ВИЧ-инфекцией для мужчин, вступающих в половые контакты друг с другом. Мет также может обострить ВИЧ-инфекцию у людей с ВИЧ.

«Тусовочные наркотики», такие как экстази, кетамин и ГГБ, могут изменить вашу способность принимать здравые решения. Употребление таких наркотиков повышает вероятность незапланированного и незащищенного секса или употребления других наркотиков, что повышает риск заражения ВИЧ.

Употребление ингаляционного амилнитрата, также именуемого **«попперами»**, также приводит к увеличению риска ВИЧ. Употребление «попперов» связано с рискованным сексуальным поведением, употреблением нелегальных наркотиков и инфекциями, передаваемыми половым путем среди гомосексуалов и бисексуалов. Попперы также все чаще употребляются подростками.

Обязательно получите ответы на любые вопросы, возникшие у вас относительно ВИЧ или СПИДа. В этом вам могут помочь ваш местный отдел общественного здравоохранения, врач и публичная библиотека.



Text is from HIV/AIDS sources from the Department of Health and Human Services and adapted by HealthReach and Healthy Roads Media. This project has been funded in whole or in part with Federal funds by the National Library of Medicine award number HHSN276201500011 awarded to the Center for Public Service Communications. Images from iStock.com.