

Efectos secundarios: Medicamentos para el VIH, parte 3



El tratamiento del VIH, denominado tratamiento antirretrovírico o TAR, es una combinación de medicamentos para el VIH, que se conoce como terapia anti-VIH. Los medicamentos para el VIH ayudan a las personas infectadas a llevar una vida más prolongada y saludable, pero también provocan efectos secundarios. La mayoría de los efectos secundarios son leves, pero algunos pocos pueden ser graves.

Los distintos medicamentos para el VIH pueden provocar distintos efectos secundarios. Hay personas que toman el mismo medicamento para el VIH y presentan efectos secundarios muy diferentes.

Muchos de los medicamentos más nuevos para el VIH tienen menos efectos secundarios que los más antiguos. El profesional sanitario trabajará con usted para decidir cuáles son los mejores medicamentos para incluir en su terapia anti-VIH.

Si está tomando medicamentos para el VIH, informe al profesional sanitario sobre cualquier efecto secundario que presente. Algunos efectos secundarios, como el dolor de cabeza o los mareos ocasionales, pueden no ser graves. Sin embargo, toda hinchazón en el rostro, los ojos, los labios, la garganta o la lengua es un efectos secundario muy grave que requiere atención médica inmediata.



A veces, estos efectos secundarios pueden no estar para nada asociados con el medicamento contra el VIH. Los efectos secundarios pueden ser causados por otras afecciones médicas que no sean el VIH, como una infección que puede ser tratable. El profesional sanitario evaluará si el efecto secundario es causado por el medicamento que toma para el VIH o por otra afección.

Los efectos secundarios pueden durar solo unos pocos días o semanas, o persistir por un tiempo mucho más prolongado. Es posible que no aparezcan durante meses o incluso años después de comenzar a tomar un medicamento contra el VIH. Es posible que el profesional sanitario cambie sus medicamentos para el VIH para reducir los efectos secundarios. Existen muchos medicamentos que pueden incluirse en la terapia anti-VIH.



No reduzca ni omita las dosis, ni deje de tomar los medicamentos para el VIH, a menos que el profesional sanitario así se lo indique.

No dude en buscar las respuestas para las preguntas que tenga sobre el VIH/SIDA. El Departamento de Salud Pública, el profesional sanitario y una biblioteca pública serán de gran ayuda.

Text is from HIV/AIDS sources from the Department of Health and Human Services and adapted by HealthReach and Healthy Roads Media. This project has been funded in whole or in part with Federal funds by the National Library of Medicine award number HHSN276201500011I awarded to the Center for Public Service Communications. Images from iStock.com.