

Interacciones farmacológicas: Medicamentos para el VIH, parte 6

El tratamiento del VIH, denominado tratamiento antirretrovírico o TAR, es una combinación de medicamentos para el VIH, que se conoce como terapia anti-VIH.

Las reacciones que se producen entre dos o más medicamentos se llaman "interacciones medicamentosas". También pueden ocurrir interacciones entre un medicamento y un alimento o una bebida. Estas se denominan "interacciones medicamento-alimento". Una interacción medicamentosa también puede ser el resultado de una afección médica. Estas se denominan "interacciones medicamento-afección".



Los medicamentos nos ayudan a sentirnos mejor y mantenernos saludables. Sin embargo, las interacciones medicamentosas pueden causar problemas al reducir o aumentar la acción de un medicamento. Las interacciones también pueden provocar efectos secundarios dañinos.

Las interacciones medicamentosas entre los medicamentos para el VIH son frecuentes. Las interacciones que tienen lugar entre los medicamentos para el VIH pueden reducir o aumentar la cantidad de medicamento para el VIH en el torrente sanguíneo. Ese cambio en la cantidad de medicamento en el torrente sanguíneo puede reducir o aumentar la eficacia del medicamento o hacerlo tan fuerte que causará efectos secundarios peligrosos.

Las interacciones medicamentosas entre los medicamentos para el VIH y otros medicamentos también son frecuentes. Los medicamentos para el VIH, por ejemplo, pueden reducir la eficacia de las píldoras anticonceptivas. Las mujeres VIH positivo que usan anticonceptivos hormonales deberán usar un método anticonceptivo adicional o diferente para evitar el embarazo.

Los alimentos o las bebidas pueden afectar el funcionamiento de los medicamentos para el VIH. Pueden aumentar o disminuir la cantidad de medicamento que haya en la sangre. En función del medicamento para el VIH que se utilice, estos cambios en la cantidad de medicamento en el torrente sanguíneo pueden ser favorables o dañinos.

El embarazo es un estado que puede afectar la forma en que el organismo utiliza los medicamentos para el VIH. Por este motivo, es necesario cambiar las dosis de los medicamentos para el VIH durante las diferentes etapas del embarazo.



Informe al profesional sanitario sobre todos los medicamentos recetados y no recetados que esté tomando o piensa tomar. Avísele también si toma vitaminas, suplementos nutricionales y productos herbarios. Las etiquetas de los medicamentos y sus prospectos incluyen información importante sobre las posibles interacciones medicamentosas. ¡Léalas!

No dude en buscar las respuestas para las preguntas que tenga sobre el VIH/SIDA. El Departamento de Salud Pública, el profesional sanitario y una biblioteca pública serán de gran ayuda.

Text is from HIV/AIDS sources from the Department of Health and Human Services and adapted by HealthReach and Healthy Roads Media. This project has been funded in whole or in part with Federal funds by the National Library of Medicine award number HHSN2762015000111 awarded to the Center for Public Service Communications. Images from iStock.com.